

VALORI CRITICI

IN QUESTI CASI IL LABORATORIO PROVVEDE AD AVVISARE IL MEDICO E A CONTATTARE IL PAZIENTE PER CONSEGNARE IL REFERTO CON URGENZA.

Secondo Linea guida: "RACCOMANDAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA GESTIONE DEI VALORI CRITICI NEI LABORATORI CLINICI" SIBioC 2008.

Il Laboratorio ha scelto di considerare "critici", con caratteristiche di urgenza, i seguenti valori:

ESAME	Inferiore a:	Superiore a:
Sodio (mmol/L)	120	160
Potassio (mmol/L)	2.8	6.2
Calcio (mg/dl)	6.5	14
Glucosio (mg/dl)	40	300
Emoglobina (g/dl)	7	18
Ematocrito (%)	20	60
Leucociti (ul)	2.000	30.000
Fibrinogeno (mg/dl)	100	/
Piastrine (10 ³ /ul)	70	800
PT (INR) Terapia	/	4.5
APTT (ratio)	/	2.5

- Urine marcatamente positive per **glucosio** ed **acetone** nei bambini e nei soggetti di cui non si conosce la diagnosi di diabete.
- **Emoglobinuria** grave in assenza di globuli rossi all'osservazione microscopica
- **Proteinuria** in gravidanza

5/11/2025
 (A. B. S. M.)

Luca G. Mercante